

fabulis OD[®]

GROEI-REGULATOR TEGEN LEGEREN IN WINTERARWE, ZOMERTARWE, WINTERGERST, ZOMERGERST, WINTERPELT EN ZOMERSPELT, WINTERROGGE, ZOMERROGGE, WINTERHAVER, ZOMERHAVER, WINTERTRITICALE, ZOMERTRITICALE.

REGULATEUR DE CROISSANCE CONTRE VERSE EN FROMENT D'HIVER, FROMENT DE PRINTEMPS, ORGE D'HIVER, ORGE DE PRINTEMPS, EPEAUTRE D'HIVER, EPEAUTRE DE PRINTEMPS, SEIGLE D'HIVER, SEIGLE DE PRINTEMPS, AVOINE D'HIVER, AVOINE DE PRINTEMPS, TRITICALE D'HIVER & TRITICALE DE PRINTEMPS.

WACHSTUMSREGLER GEGEN LAGER BEI WINTERWEIZEN, SOMMERWEIZEN, WINTERGERSTE, SOMMERGERSTE, WINTERDINKEL UND SOMMERDINKEL, WINTERROGGEN, SOMMERROGGEN, WINTERHAFER, SOMMERHAFER, WINTERTRITICALE, SOMMERTRITICALE.

ONDERSTEBOVEN DRAAIEN EN GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. BOUCHON VERS LE BAS, BIEN AGITER AVANT EMPLOI.
VOR GEBRAUCH AUF DEN KOPF STELLEN UND GUT SCHÜTTELN.

NUMÉRO D'AUTORISATION: 10902P/B

TOELATINGSNUMMER: 10902P/B

ZULASSUNGSNUMMER: 10902P/B

SUBSTANCE ACTIVE/WERKZAME STOF/WIRKSTOFF:

Olíe dispersie (OD)

op basis van 50 g/l prohexadione.

Öldispersion (OD)

auf Basis von 50 g/L Prohexadion

Dispersion huileuse (OD)

à base de 50 g/L prohexadione.

**EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL/UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK/
NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

Centre Antipoisons/Antigifocentrum/Antigiftzentrum: 070/245 245.

NUMÉRO DU LOT/LOTNUMMER/CHARGENUMMER

DATE DE PRODUCTION/PRODUCTIEDATUM/ PRODUKTIONS DATUM

VOIR EMBALLAGE/ZIE VERPAKKING/SIEHE VERPAKKUNG.

DATE D'EXPIRATION: 2 ANS APRÈS LA DATE DE PRODUCTION INDIQUÉE SUR L'EMBALLAGE/VERVALDATUM: 2 JAAR NA DE PRODUCTIEDATUM VERMELD OP DE FLES/VERFALLSDATUM: 2 JAHRE NACH DEM AUF DER VERPAKKUNG ANGEgebenEN PRODUKTIONS DATUM.

gedeponeerd handelsmerk van / marque déposée de / eingetragenes Warenzeichen von:
DE SANGOSSE B. S.A.S.

**Détenteur de l'autorisation/
Toelatingshouder/Zulassungsinhaber :**

DE SANGOSSE S.A.S.

BONNEL CS10005

FR-47480 PONT DU CASSE

Tel. 05 53 69 36 30

Fax. 05 53 66 30 65

www.desangosse.com

DE SANGOSSE



fine

**DISTRIBUE PAR/ VERDEELD DOOR /
VERTRIEBEN DURCH:**

Fine Agrochemicals B.V.

Verlengde Poolseweg 16, NL- 4818 CL Breda

enquire@fine.eu

Tel: 32(0)52354465

**Classification et étiquetage conformément au
Règlement (CE) n° 1272/2008**

Conseils de prudence (phrases P)

P391 : Recueillir le produit répandu.

**Informations additionnelles sur les dangers
(phrases EUH)**

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**Phrases selon le Règlement (CE) n° 1107/2009
ou le Règlement (UE) n° 547/2011**

**Phrases types indiquant les mesures de
sécurité (phrases SP):**

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque).

SPe8 : Dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison de la culture. Ne pas utiliser en zone de butinage. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.

SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

**Indeling en etikettering in overeenstemming
met Verordening (EG) nr 1272/2008**

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen)

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen)

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Zinnen volgens Verordening (EG) nr 1107/2009
of (EU) nr. 547/2011**

**Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen
(SP zinnen):**

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

SPe8 : Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid.

SPo: Na de behandeling de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

**Einstufung und Kennzeichnung gemäß Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Sicherheitshinweise (P- Sätze)

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**Sätze gemäß Verordnungen (EG) Nr. 1107/2009
und (EU) Nr. 547/2011**

**Standardsätze Für Sicherheitshinweise
(SP-Sätze)**

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächen-gewässer einhalten (siehe Maßnahmen zur Risikominimierung).

SPe8 : Gefährlich für Bienen und andere bestäubende Insekten. Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futter-suche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

SPo: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.



**CONTENU NET/NETTO
INHOUD/NETTOINHALT:**

10 LTR

FAB/BE/10L/24

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

FABULUS® OD is een groeiregulator waarmee de hoogte van de planten beperkt kan worden om de legering onder controle te houden en de opbrengst van de teelt te vrijwaren. Het actieve bestanddeel, prohexadione, wordt systemisch naar alle delen van de groeiende plant gevoerd. Het voorkomt de latere biosynthese stadia van de gibberelline met als gevolg een snelle en aanzienlijke afname van de omvang van de internodiën van de stengel.

GEbruik en gebruikswijze

Lees aandachtig het etiket voor gebruik. Eindel of specifiek vermeldde gewassen onder 'teelt' zijn toegelaten. De gebruiksaanwijzingen moeten per gewas geraadpleegd worden.

Wintertraw, zomertraw, wintergerst, zomergerst, winterapri, zomerpaprika (open lucht)	Lageren	1,5 Oha in 1 toepassing of eventueel in 2 gefractioneerde toepassingen met een interval van minstens 7 dagen.	In de lente, vanaf het stadium einde uitbloei (BBCH 29) tot wanneer de ligula zichtbaar is (BBCH 39).
Toepassingsvoorwaarden: Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het opgravingwater.			
Winterrogge, zomerrogge, winterhaverv, zomerhaverv (open lucht)	Lageren	1,5 Oha in 1 toepassing of eventueel in 2 gefractioneerde toepassingen met een interval van minstens 7 dagen.	In de lente, vanaf het stadium eerste knoop (BBCH 31) tot het stadium vierde knoop (BBCH 34).
Toepassingsvoorwaarden: Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het opgravingwater.			
Wintertriticale, zomertriticale (open lucht)	Lageren	1,5 Oha in 1 toepassing of eventueel in 2 gefractioneerde toepassingen met een interval van minstens 7 dagen.	In de lente, vanaf het stadium einde uitbloei (BBCH 29) tot het stadium vierde knoop (BBCH 34).
Toepassingsvoorwaarden: Risicobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het opgravingwater.			

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

Gebruik FABULUS® OD enkel op actief groeiende teelten. Stel de behandeling uit in periodes met extreem lage of hoge temperaturen. Voor de behandeling is een vestrijke periode van 3 tot 4 dagen aangewezen. Behandel de granen in goede gezondheid en zonder fysieke stress (verzanding, droogte of andere omstandigheden). De toepassing onder niet-optimale omstandigheden kan tot vergeling, leiden. Deze symptomen hebben uitsluitend gevolgen voor de af aanwezig bladeren tijdens de toepassing, niet voor de uiteindelijke opst. FABULUS® OD kan op alle peesgekeurde teeltrassen gebruikt worden. De mate waarin de hoogte beperkt kan worden, varieert tussen de verschillende rassen, met een meer uitgesproken effect voor de hoogste gewassen.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De eerdere dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gerealiseerd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestelde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verminderen, noch de wachttijd voor de opst te verminderen.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVoORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Schudden voor gebruik.
- Gebruik FABULUS® OD in minimum 100 l water per hectare.
- Vermijd overlappings van de spuitwiel en zorg ervoor dat de spuithoogte goed is afgesteld.
- Laat de inhoud niet gedurende lange periodes in de sproeier staan ('s nachts).
- Gewassen met een aanzienlijk waterdeficiënt mogen niet worden behandeld.
- Gewassen met de mogelijke mengingen u te informeren bij uw dealer.

Reiniging spuitapparatuur:

- Reinig de spuitapparatuur onmiddellijk na elk gebruik zorgvuldig met zuiver water. Volg de goede praktijken en adviezen van de fabrikant van het materiaal.

Voorgeschied:

- Na de oogst van tarwe, gerst, haver, opgevoerd of triticale kan elk type gewas geplant worden.
- Het is niet nodig de grond even te ploegen alvorens het volgende gewas te zaaien.

Weggebruik:

- FABULUS® OD toegeweerd wordt aan een mengsel met andere anti-groei-regulators, dient u de instructies voor de andere producten, met name wat betreft de mengproporties, nauwkeurig te bevestigen. Elk product moet zorgvuldig in de spuitbak worden toegevoegd en moet volledig opgelost zijn voor er een ander bijkomend product kan worden toegevoegd.

BEHANDELING VAN DE SPUITOPLOSSING: BEHANDELING VAN DE LEEGE VERPAKKING

EN BEHANDELINGSVOORWAARDEN

Het product in de voor 3/4 gevulde spuittank geleen. Mengten en verder met water aanvullen. De zorgvuldige geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespeld te worden, dwars (d.w.z. op verschillende plaatsen), om het behoud van een reinigings-systeem met water onder druk dat op het sproeiend middel is.

Het bekomen spuitwater moet in de spuittank geleen worden. De aldus gespeld verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorziene inzamelingspunt. De behandelingsvoorschriften minstens 10 maal verdunnen en verspreiden op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te verwijderen, moet de hoeveelheid spuitvoorstof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORBEREIDING VAN DE TOEGANG TOT HET GROND- EN OPGRAVINGWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van rijsen of wegen kan worden verontreinigd.
- SP2: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruikswijze'.
- SP3: Naast de op de etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing.
- Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Diffusie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterbeveiliging en tijdsbeheer. Spuit bij windsstijl weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Ecologische problemen: het is ten zeerste aanbevolen om erode heuvels de maatregelen te nemen op percelen die ernstig gevoelig zijn om afgevoerd naar oppervlaktewater te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik de juiste voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Was handen en wasgebede vaak voor het eten en op het einde van de werkdag.
- Het drink of rook niet terwijl u dit product gebruikt.
- Het product in een originele gesloten verpakking verspreiden in een frisse, droge en afgedelende ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- Dit is de behandeling, de percelenverpakkingen pas opnieuw behandelen nadat de spuitvoorstof is opgeloopt.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

- Een te hulp maatregelen
- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

RAADSLAGEN

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij overmatig roken of een arts raadplegen.

RAADSLAGEN

Vernietig de kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie een arts raadplegen. Vernietig de kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, vlijen spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende informatie: contacteer het Anticentrum 070245.245.

WAARSCHUWING

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onbepaalde kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij weten dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gegen hij alleen over de speciale toepassingsmethoden beschikt.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Les attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit. Seules les cultures mentionnées dans 'culture' sont autorisées. Les conditions d'utilisation doivent être consultées pour chaque culture.

Culture	Pour l'usage	Dose	State d'application
Froment d'hiver et de printemps, orge d'hiver et de printemps, épeautre d'hiver et de printemps (plein air)	Verse	1,5 Oha, éventuellement fractionné en deux applications à intervalle d'eau (BBCH 29) jusqu'au stade ligule visible moins 7 jours.	Au printemps du stade fin tillage (BBCH 39) jusqu'au stade ligule visible (BBCH 39).
Sorgho d'hiver et de printemps, avoine d'hiver et de printemps (plein air)	Verse	Conditions d'application : Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.	Au printemps du stade premier noeud (BBCH 31) jusqu'au stade quatrième noeud (BBCH 34).
Triticale d'hiver et de printemps (plein air)	Verse	Conditions d'application : Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.	Au printemps du stade fin tillage (BBCH 29) jusqu'au stade quatrième noeud (BBCH 34).
Triticale d'hiver et de printemps (plein air)	Verse	Conditions d'application : Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 mètre avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.	Au printemps du stade fin tillage (BBCH 29) jusqu'au stade quatrième noeud (BBCH 34).

Remarques/Recommandations générales

Utiliser FABULUS® OD uniquement sur les cultures qui peuvent être traitées. Retarder le traitement pendant les périodes de températures extrêmement basses ou élevées. Une période de 3 à 4 jours sans gel est préférable avant de traiter. Traiter les céréales en bonne santé et sans aucun stress physique (température, sécheresse ou autres conditions). L'application dans des conditions non optimales peut entraîner un jaunissement. Ces symptômes affectent uniquement les feuilles présentes lors de l'application, mais pas le rendement final. FABULUS® OD peut être utilisé sur toutes les variétés de cultures approuvées. Toutefois, le degré de réduction de la hauteur varie entre les différentes variétés, avec un effet plus prononcé sur certaines variétés, notamment les cultures plus hautes.

Remarque générale concernant la dose

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, en fonction de l'efficacité des effets recherchés ou de la sensibilité variétale. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- Agiter avant emploi.
- Utiliser FABULUS® OD dans 100 l d'eau minimum par hectare.
- Éviter les chevauchements de pulvérisation et veiller à bien régler la hauteur de pulvérisation.
- Utiliser le contenu du réservoir le même jour et ne pas le conserver jusqu'au lendemain.
- Les cultures avec un déficit hydrique important ne peuvent pas être traitées.
- Pour les mélanges possibles, veuillez-vous informer auprès de votre distributeur.