

 **pygmalion**[®]

UFI: 7HS2-S06R-K002-X4SU



FONGICIDE POUR LE TRAITEMENT CONTRE PHYTOPHTHORA DE LA POMME DE TERRE, LA CULTURE DE PLANTS DE POMMES DE TERRE ET LA SEPTORIOSE DU BLÉ, TRITICALE ET ÉPEAUTRE

FUNGICIDE VOOR DE BEHANDELING VAN PHYTOPHTHORA BIJ AARDAPPELEN, AARDAPPELPOTGOEDTEELT EN SEPTORIA BIJ TARWE, TRITICALE EN SPELT.

FUNGIZID ZUR BEHANDLUNG VON PHYTOPHTHORA IN KARTOFFELN, PFLANZKARTOFFELN UND SEPTORIA IN WEIZEN, TRITICALE UND DINKEL.

SUBSTANCE ACTIVE / WERKZAME STOF / WIRKSTOFF:

CONCENTRÉ SOLUBLE (SL) CONTENANT PHOSPHONATES DE POTASSIUM : 755 G/L (51,7% W/W)
MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT (SL) BEVATTEND 755G/L KALIUMFOSFONATEN (51,7 % W/W)
755G/L (51,7% W/W) KALIUMPHOSFONAT IN FORM EINES WASSERLÖSLICHEN KONZENTRATS (SL).

NUMÉRO D'AUTORISATION / TOELATINGSNUMMER / ZULASSUNGSNUMMER: 29013P/B

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL / UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Numéro du lot/Lotnummer : Chargennummer/Date de production/Productiedatum/ Produktionsdatum:
Voir emballage/Zie verpakking/Siehe Verpackung.

PYG/BE/10L/25F_v3

DÉTENTEUR DE L'AUTORISATION /
TOELATINGSHOUDER /
ZULASSUNGSINHABER

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL CS10005
FR_ 47480 PONT DU CASSE
TEL. +33 5 53 69 36 30
FAX. +33 5 53 66 30 65
WWW.DESANGOSSE.COM

DISTRIBUÉ PAR / VERDEELD DOOR /
VERTRIEBEN DURCH:

fine

Fine Agrochemicals B.V.
Verlengde Poolseweg 16,
NL - 4818 CL Breda
Tel: 32(0)52 35 44 65
www.fine.eu



www.agrirecover.eu

**CONTENU NET /
NETTO INHOUD /
NETTOINHALT:**

10 L

PYGMALION[®] - est une marque déposée de DE SANGOSSE S.A.S. /
is een bij de EU geregistreerd handelsmerk van DE SANGOSSE S.A.S./
ist eine EU eingetragene Marke der Firma DE SANGOSSE S.A.S.F

**AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE /
GELIEVE DIT ETIKET VOLLEDIG TE LEZEN VOOR GEBRUIK /
VOR GEBRAUCH DAS ETIKETT VOLLSTÄNDIG LESEN.**

USAGES : Les applications pour lesquelles le produit est autorisé et les conditions particulières d'application:

Froment d'hiver (*Triticum aestivum* (winter)) : toutes les variétés
Froment de printemps (*Triticum aestivum* (spring)) : toutes les variétés
Triticale d'hiver (*Triticale x Secale* (winter)) : toutes les variétés
Triticale de printemps (*Triticale x Secale* (spring)) : toutes les variétés
Épeautre d'hiver (*Triticum spelta* (winter)) : toutes les variétés
Épeautre de printemps (*Triticum spelta* (spring)) : toutes les variétés
Blé dur d'hiver (*Triticum durum* (winter)) : toutes les variétés
Blé dur de printemps (*Triticum durum* (spring)) : toutes les variétés

Localisation du traitement : plein air

Type de culture : tout

Stade d'application : 5 talles visibles - fin de l'épiaison : l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 25–59)

Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*)

Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation

Dose : 4L/ha

Nombre d'applications : 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications : 23 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

Pommes de terre (*Solanum tuberosum*) : traitement de la culture depuis l'implantation jusqu'à 7 jours avant la récolte des pommes de terre (primeurs et de conservation)

Culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*) : traitement de la culture depuis l'implantation jusqu'à 7 jours avant la récolte des pommes de terre. Pommes de terre cultivées pour la production de plants, toutes les variétés. Les tubercules de calibre excessif peuvent être vendus pour la consommation. Lors de la manipulation de la culture traitée, porter des gants résistants aux produits chimiques.

Localisation du traitement : plein air

Type de culture : tout

Stade d'application : ≥ BBCH 10 (les premières feuilles s'allongent)

Délai avant la récolte : 7 jour(s)

Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : mildiou (*Phytophthora infestans*)

Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation

Dose : 4L/ha

Nombre d'applications : 1 à 3

Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

Pygmalion® est un fongicide systémique à action préventive. Sa matière active, le phosphonate de potassium, est une substance naturelle d'origine minérale et présente une efficacité directe sur les pathogènes, ainsi qu'une action indirecte par la stimulation des défenses naturelles de la plante. Cette substance active est systémique et se répartit dans l'ensemble de la plante après pénétration via le système foliaire. Ainsi, **pygmalion®** assure une très bonne protection des organes néoformés dans le cadre de nos recommandations d'emploi.

Pygmalion® apporte un nouveau mode d'action pour la gestion de la résistance de la septoriose du blé et du mildiou de la pomme de terre.

Pygmalion® doit être appliqué en préventif, dans le cadre d'un programme fongicide. Suivez les recommandations de votre conseiller ou des avertissements régionaux/autorités compétentes pour déclencher les traitements.

Pygmalion® pouvant être utilisé conjointement avec d'autres produits, il incombe à l'utilisateur de lire attentivement les étiquettes et les conditions d'utilisation du ou des produits associés.

SUR BLES :

Au stade 1-2 nœuds, **pygmalion®** peut être appliqué en association avec un partenaire anti-septoriose ou seul uniquement sur variétés tolérantes. La dose minimum d'utilisation est de 2 L/ha.

Autour du stade dernière feuille étalée, **pygmalion®** est recommandé en association avec un partenaire anti-septoriose. La dose minimum d'utilisation est de 2 L/ha.

SUR POMMES DE TERRE :

Pour une performance optimisée, **pygmalion®** ne doit pas être utilisé seul mais appliqué en association avec un partenaire anti-mildiou. Le partenaire sera choisi en fonction du stade de l'application et de la pression mildiou. Selon le partenaire choisi, sa dose d'application sera adaptée et pourra être réduite dans certains cas. Demandez conseil à votre technicien pour intégrer **pygmalion®** dans votre itinéraire technique.

Précautions d'emploi :

Il est recommandé d'adapter le volume d'eau au stade de développement de la culture et de soigner l'application afin que le produit recouvre bien l'ensemble de la végétation. Éviter d'atteindre le point de ruissellement, ajuster pression et vitesse d'avancement afin d'obtenir une couverture suffisante de la végétation.

Pygmalion® est à l'abri du lessivage 2 heures après application. Si une pluie lessivante survient dans cet intervalle, renouveler la protection. **Pygmalion®** est sélectif de la pomme de terre appliqué 3 fois et du blé (triticale et épeautre) appliqué 2 fois.

Nos préconisations sont issues d'essais réalisés sur plusieurs années. Cependant, plusieurs facteurs tels que les conditions climatologiques, techniques de traitement, mélanges non préconisés peuvent présenter des conséquences sur l'efficacité ou la sélectivité du traitement.

Autres mentions/ phrases nationales

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Préparation de la bouillie

Ajouter la quantité préconisée **pygmalion®** dans la cuve du pulvérisateur remplie à moitié d'eau, puis compléter le volume d'eau tout en remuant jusqu'à la fin du remplissage et durant l'application. Utiliser la bouillie de traitement dans les 24 heures. Laver soigneusement le pulvérisateur à l'eau claire immédiatement après l'utilisation.

Compatibilité

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la législation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques agricoles. De nombreux mélanges fongicides ont été validés, demander conseil à votre technicien pour toute question. Pour tout mélange avec un engrais foliaire, nous consulter.

STOCKAGE, EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et à la fin de la journée de travail.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.

Conserver dans le conteneur d'origine, hermétiquement fermé et en lieu sûr.

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le Centre Antipoisons ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le Centre Antipoisons ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Remarques pour le médecin: traitement symptomatique.
Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons: 070/245.245.

CONDITIONS DE GARANTIE DES PRODUITS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Toute reproduction totale ou partielle de cette étiquette est interdite.

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage. Ils ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous la responsabilité de l'utilisateur, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces...

Le fabricant garantit la qualité du produit vendu dans son emballage d'origine et stocké selon les conditions préconisées, ainsi que sa conformité à l'autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités compétentes. Pour les denrées issues de cultures protégées avec cette spécialité et destinées à l'exportation, il est de la responsabilité de l'exportateur de s'assurer de la conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

GEBUIKEN: De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

Wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter)) : alle variëteiten
Zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring)) : alle variëteiten
Wintertriticale (*Triticale x Secale* (winter)) : alle variëteiten
Zomertriticale (*Triticale x Secale* (spring)) : alle variëteiten
Winterspelt (*Triticum spelta* (winter)) : alle variëteiten
Zomerspelt (*Triticum spelta* (spring)) : alle variëteiten
Winterdurum (*Triticum durum* (winter)) : alle variëteiten
Zomerdurum (*Triticum durum* (spring)) : alle variëteiten

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 5 spruiten zichtbaar - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 25–59)

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladplekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici* / *Leptosphaeria nodorum*)

Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting

Dosis: 4 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 23 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Aardappelen (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot 7 dagen voor de oogst van de aardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)

Aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot 7 dagen voor de oogst van de aardappelen.

Aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken, alle variëteiten. Bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie.

Tijdens de manipulatie van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: ≥ BBCH 10 (verlenging eerste bladeren)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: phytophthora (*Phytophthora infestans*)

Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting

Dosis: 4 L/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Pygmalion® is een systemische fungicide met preventieve werking.

De werkzame stof, kaliumfosfonaat, is een natuurlijke stof van minerale oorsprong en heeft een direct effect op ziektekiemen en indirecte werking door de natuurlijke afweer van de plant te stimuleren en wordt na opname via de bladeren door de plant verspreid. Daarmee zorgt **pygmalion®** voor een zeer goede bescherming van nieuw gevormde plantedelen, mits de aanbevolen gebruiksaanwijzingen worden gevolgd.

Pygmalion® biedt een nieuwe manier om de resistentie van septoriose in tarwe en van aardappelziekte te bestrijden.

Pygmalion® moet worden gebruikt als een preventieve behandeling in een fungicide programma. Volg de aanbevelingen van uw adviseur, de regionale waarschuwingen en aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten voordat u begint met de behandeling.

Omdat **pygmalion®** in samenwerking met andere producten kan gebruikt worden is het aan de gebruiker om de etiketten en gebruiksvoorwaarden van de bijbehorende producten aandachtig te lezen.

TARWE :

In het stadium van 1-2 spruiten kan **pygmalion®** worden toegepast samen met een middel tegen bladvlekkenziekte (*septoria*). Op tolerante rassen kan zonder begeleidend middel worden toegepast. De minimumdosis is 2 L/ha.

Rond het stadium dat het laatste blad opengevouwen is wordt het aanbevolen om **pygmalion®** samen met een middel tegen bladvlekkenziekte (*septoria*) toe te passen. De minimumdosis is 2 L/ha.

AARDAPPELEN :

Voor de beste resultaten moet **pygmalion®** gecombineerd worden met een middel tegen aardappelziekte dat moet worden gekozen op grond van de ontwikkelingsfase van het gewas en de druk van de aardappelziekte. Afhankelijk van het gekozen tweede middel wordt de toepassingsdosis aangepast en eventueel verlaagd. Vraag uw adviseur hoe u **pygmalion®** het best gebruikt in het spuitschema.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik :

Het wordt aanbevolen de hoeveelheid water aan te passen aan het ontwikkelingsstadium van het gewas, zodat het product alle planten goed bedekt. Zorg ervoor dat het product niet van de plant afvloeit: pas de druk en de rijsnelheid aan zodat alle planten voldoende bedekt worden. **Pygmalion®** is 2 uur na het aanbrengen beschermd tegen afspoelen. Bij hevige regen binnen deze periode moet de behandeling worden herhaald.

Pygmalion® is selectief voor aardappelen na 3 toepassingen en voor tarwe (triticale en spelt) na 2 toepassingen.

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op testen die over verschillende jaren zijn uitgevoerd. Er zijn echter altijd factoren – zoals de weersomstandigheden, behandelingstechnieken, niet-aanbevolen mengsels – die de doeltreffendheid of selectiviteit van de behandeling kunnen beïnvloeden.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Vorbereiding spuitoplossing

De nodige **pygmalion®** hoeveelheid in een halfvolle tank al roerend bijvoegen. Vul voorzichtig de tank verder tot het volledige volume bekomen is. Laat de roerinstallatie aan tijdens het spuiten. De oplossing binnen 24 uren gebruiken. Maak de sproeier meteen na gebruik zorgvuldig schoon met water.

Mengbaarheid

Tankmixen moeten worden toegepast in overeenstemming met de geldende voorschriften en aanwijzingen van goede landbouwpraktijken. Veel fungicidemengsels zijn mogelijk, vraag uw technicus om advies indien u vragen heeft. Als u een mengsel met bladmeststoffen wilt maken, neemt u contact op met uw leverancier.

OPSLAG, LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

Was uw handen en uw blootgestelde huid voor een maaltijd en aan het einde van de werkdag.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product.

Op een veilige plaats in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren.

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (drie opeenvolgende malen schudden). Het bekomen spelwater ca. 10 maal verdunnen en verspreiden op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

EERSTE-HULP MAATREGELEN:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het Antigifcentrum of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het Antigifcentrum of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.

PRODUCT GARANTIE VOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De volledige of gedeeltelijke reproductie van dit etiket is verboden.

Respecteer het gebruik, doses, gebruiksvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen zoals vermeld op de verpakking. Ze zijn bepaald op basis van de eigenschappen van het product en de toepassingen waarvoor het wordt aanbevolen. Voer op deze basis de teelt en behandelingen uit volgens goede landbouwpraktijken, waarbij, onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, rekening wordt gehouden met alle specifieke factoren die uw behandeling betreffen, zoals de aard van de bodem, weersomstandigheden, teeltmethoden, plantenvariëteiten, soorten weerstand...

De fabrikant waarborgt de kwaliteit van het product dat in de originele verpakking wordt verkocht en wordt bewaard volgens de aanbevolen omstandigheden, evenals de naleving van de toelating voor het in de handel brengen zoals afgegeven door de bevoegde overheid. Voor voedingsmiddelen afkomstig van gewassen, beschermd door dit product en bestemd voor de uitvoer, is het de verantwoordelijkheid van de uitvoerder om ervoor te zorgen dat de geldende wetgeving in het invoerende land wordt nageleefd.



pygmalion®

UFI: 7HS2-S06R-K002-X4SU



4 251817 300180 >

FONGICIDE POUR LE TRAITEMENT CONTRE PHYTOPHTHORA DE LA POMME DE TERRE, LA CULTURE DE PLANTS DE POMMES DE TERRE ET LA SEPTORIOSE DU BLÉ, TRITICALE ET ÉPEAUTRE

FUNGICIDE VOOR DE BEHANDELING VAN PHYTOPHTHORA BIJ AARDAPPELEN, AARDAPPELPOTGOEDTEELT EN SEPTORIA BIJ TARWE, TRITICALE EN SPELT.

FUNGIZID ZUR BEHANDLUNG VON PHYTOPHTHORA IN KARTOFFELN, PFLANZKARTOFFELN UND SEPTORIA IN WEIZEN, TRITICALE UND DINKEL.

SUBSTANCE ACTIVE / WERKZAME STOF / WIRKSTOFF:

CONCENTRÉ SOLUBLE (SL) CONTENANT PHOSPHONATES DE POTASSIUM : 755 G/L (51,7% W/W)
MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT (SL) BEVATTEND 755G/L KALIUMFOSFONATEN (51,7 % W/W)
755G/L (51,7% W/W) KALIUMPHOSFONAT IN FORM EINES WASSERLÖSLICHEN KONZENTRATS (SL).

NUMÉRO D'AUTORISATION / TOELATINGSNUMMER / ZULASSUNGSNUMMER: 29013P/B

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL / UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Numéro du lot/Lotnummer : Chargennummer/Date de production/Productiedatum/ Produktionsdatum:
Voir emballage/Zie verpakking/Siehe Verpackung.

PYG/BE/10L/25F_v3

DÉTENTEUR DE L'AUTORISATION /
TOELATINGSHOUDER /
ZULASSUNGSINHABER

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL CS10005
FR_ 47480 PONT DU CASSE
TEL. +33 5 53 69 36 30
FAX. +33 5 53 66 30 65
WWW.DESANGOSSE.COM

DISTRIBUÉ PAR / VERDEELD DOOR /
VERTRIEBEN DURCH:

fine

Fine Agrochemicals B.V.
Verlengde Poolseweg 16,
NL - 4818 CL Breda
Tel: 32(0)52 35 44 65
www.fine.eu



www.agrirecover.eu

**CONTENU NET /
NETTO INHOUD /
NETTOINHALT:**

10 L

PYGMALION® - est une marque déposée de DE SANGOSSE S.A.S. /
is een bij de EU geregistreerd handelsmerk van DE SANGOSSE S.A.S./
ist eine EU eingetragene Marke der Firma DE SANGOSSE S.A.S.F



Pygmalion BE 10Ltr 150x150 10Ltr 0125 - Baselabel

pygmalion®

UFI: 7HS2-S06R-K002-X4SU

SUBSTANCE ACTIVE / WERKZAME STOF / WIRKSTOFF:

CONCENTRÉ SOLUBLE (SL) CONTENANT PHOSPHONATES DE POTASSIUM : 755 G/L (51,7% W/W)
MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT (SL) BEVATTEND 755G/L KALIUMFOSFONATEN (51,7 % W/W)
755G/L (51,7% W/W) KALIUMPHOSFONAT IN FORM EINES WASSERLÖSLICHEN KONZENTRATS (SL).



CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

Informations additionnelles sur les dangers (phrases EUH)
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases selon le Règlement (CE) No 1107/2009 ou le Règlement (UE) No 547/2011

Phrases types indiquant les mesures de sécurité (phrases SP):
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est P07.
SPe2: Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
SPe8: Dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. / Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison de la culture (sauf pour les cultures dans lesquelles l'usage est autorisé aux stades de floraison BBCH 60-69) / Ne pas utiliser en zone de butinage. / Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDIELING EN ETIKETTERING IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EG) NR 1272/2008

Aanvullende gevarebinformatie (EUH zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standardszinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen)
SP1: Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking goot water verontreinigen.
SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is P07.
SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geklasseerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast worden, is het gebruik wel toegestaan.
SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
SPe8: Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. / Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen (uitgezonderd gewassen waarin de behandeling is toegestaan tijdens de bloeistadia BBCH 60-69). / Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. / Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid.
SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Ergänzende Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sätze gemäß Verordnungen (EG) Nr. 1107/2009 und (EU) Nr. 547/2011

Standardsätze Für Sicherheitshinweise (SP-Sätze)
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPa1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses Mittel nur abwechselnd mit Produkten einer anderen Wirkstoffgruppe verwendet werden. Der FRAC-Code für den Wirkmechanismus des Wirkstoffs dieses Mittels ist P07.
SPe2: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf abtragsgefährdeten Flächen ausbringen. Für die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt gilt dies für Grundstücke, die als „sterk erosiegevoelig“ eingestuft sind. Für die Wallonische Region entspricht dies den mit dem Code R gekennzeichneten Parzellen. Das Produkt kann jedoch auf diesen Parzellen verwendet werden, wenn Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodenerosion gemäß den regionalen Rechtsvorschriften umgesetzt werden.
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten (siehe Maßnahmen zur Risikominimierung).
SPe8: Bienengefährlich / Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen (außer bei Kulturpflanzen, bei denen die Verwendung in den Blühstadien BBCH 60-69 zulässig ist). / Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futter suchen sind. / Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.
SPo: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

CENTRE ANTIPOISONS: 070/245 245

ANTIGIFCENTRUM: 070/245 245

ANTIGIFTZENTRUM: 070/245 245

PYGMALION® - est une marque déposée de DE SANGOSSE S.A.S. / is een bij de EU geregistreerd handelsmerk van DE SANGOSSE S.A.S. / ist eine EU eingetragene Marke der Firma DE SANGOSSE S.A.S.F

PYG/BE/10L/248

Pygmalion BE 10Ltr 150x150 10Ltr 0125 - Panellabel

 **pygmalion**[®]

UFI: 7HS2-S06R-K002-X4SU



42518173001978

FONGICIDE POUR LE TRAITEMENT CONTRE PHYTOPHTHORA DE LA POMME DE TERRE, LA CULTURE DE PLANTS DE POMMES DE TERRE ET LA SEPTORIOSE DU BLÉ, TRITICALE ET ÉPEAUTRE

FUNGICIDE VOOR DE BEHANDELING VAN PHYTOPHTHORA BIJ AARDAPPELEN, AARDAPPELPOTGOEDTEELT EN SEPTORIA BIJ TARWE, TRITICALE EN SPELT.

FUNGIZID ZUR BEHANDLUNG VON PHYTOPHTHORA IN KARTOFFELN, PFLANZKARTOFFELN UND SEPTORIA IN WEIZEN, TRITICALE UND DINKEL.

SUBSTANCE ACTIVE / WERKZAME STOF / WIRKSTOFF:

CONCENTRÉ SOLUBLE (SL) CONTENANT PHOSPHONATES DE POTASSIUM : 755 G/L (51,7% W/W)
MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT (SL) BEVATTEND 755G/L KALIUMFOSFONATEN (51,7 % W/W)
755G/L (51,7% W/W) KALIUMPHOSFONAT IN FORM EINES WASSERLÖSLICHEN KONZENTRATS (SL).

NUMÉRO D'AUTORISATION / TOELATINGSNUMMER / ZULASSUNGSNUMMER: 29013P/B

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL / UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Numéro du lot/Lotnummer : Chargennummer/Date de production/Productiedatum/ Produktionsdatum:
Voir emballage/Zie verpakking/Siehe Verpackung.

DÉTENTEUR DE L'AUTORISATION /
TOELATINGSHOUDER /
ZULASSUNGSINHABER

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL CS10005
FR_ 47480 PONT DU CASSE
TEL. +33 5 53 69 36 30
FAX. +33 5 53 66 30 65
WWW.DESANGOSSE.COM

DISTRIBUÉ PAR / VERDEELD DOOR /
VERTRIEBEN DURCH:

fine

Fine Agrochemicals B.V.
Verlengde Poolseweg 16, NL - 4818 CL Breda
Tel: 32(0)52 35 44 65
www.fine.eu



www.agricover.eu

**CONTENU NET /
NETTO INHOUD /
NETTOINHALT:**

2 x 10 L

PYGMALION[®] est une marque déposée de DE SANGOSSE S.A.S./is een bij de EU geregistreerd handelsmerk van DE SANGOSSE S.A.S./
ist eine EU eingetragene Marke der Firma DE SANGOSSE S.A.S.F

PYG/BE/10L/25C

Pygmalion BE 10Ltr 150x150 10Ltr 0125 - Cartonlabel